

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

OLAPARIB

El olaparib es un medicamento del grupo llamado “terapia blanco” que se usa para tratar algunos tipos de cáncer. Es un comprimido que se toma por vía oral.

El medicamento puede tomarse solo o en combinación con otros medicamentos, comúnmente con el bevacizumab (intravenoso) o con tratamiento antihormonales orales.

Alimentación:

- Se puede tomar olaparib con alimentos o con el estómago vacío.
- Si olvida una dosis de olaparib, omita la dosis olvidada y vuelva a sus horarios habituales de dosificación. NO tome dosis adicionales ni duplique su dosis para compensar la dosis que olvidó.
- Si vomita la dosis de olaparib dentro de 1 hora después de tomarlo, no tome una segunda dosis. Infórmele a su equipo de atención médica, ya que es posible que se requiera un medicamento para prevenir las náuseas en dosis futuras.
- Evite la toronja y el jugo de toronja durante la duración de su tratamiento, ya que pueden interactuar con olaparib.
- El consumo de alcohol (en pequeñas cantidades) no parece afectar la seguridad o utilidad de olaparib.

Otros fármacos como el itraconazol y la rifampicina pueden interactuar con el olaparib. Informe a su médico si está tomando estos o cualquier otro medicamento.

El olaparib puede dañar los espermatozoides y puede dañar al bebé si se usa durante el embarazo. Lo mejor es usar un método anticonceptivo mientras está en tratamiento con olaparib y durante 1 mes después de la última dosis. Informe inmediatamente a su médico si usted o su pareja quedan embarazadas.

Reacciones Adversas Serias y Especiales por el tratamiento.

Son efectos secundarios inesperados y poco probables pueden presentarse.

- **Trombos (coágulos) en venas de extremidades:** Se ha relacionada cuando se usa como tratamiento para cáncer de próstata y cuando hay antecedentes de trombos previos. Los datos de alarma son hinchazón de alguna extremidad, dolor o cambios en la coloración o textura de la piel.
- **Neumonitis:** Los síntomas para sospechar esta condición son falta de aire persistente, tos progresiva sin mejoría con medicamentos habituales, cansancio, dificultad para respirar. Se debe confirmar el diagnóstico medicamento estudios de imagen.
- **Alteraciones en la producción de células en la sangres (llamados síndromes mielodisplásicos/leucemia mieloide aguda):** Es un efecto secundario muy raro, se da en menos del 1.5% de pacientes que han sido tratadas previamente con quimioterapia a base de platinos. Las primeras sospechas serán por los resultados de laboratorio de sangre, en caso necesario se derivará a un médico especialista en hematología.

Recomendaciones de reacciones adversas

EFECTOS SECUNDARIOS	MANEJO
<p>La diarrea puede ocurrir entre los tratamientos (se pudiera presentar alrededor de la 8^a semana de inicio del tratamiento).</p> <p>Disminución del apetito. Puede haber pérdida del apetito y alteración en el sabor de los alimentos que podrían causar disminución en la cantidad de de alimentos ingiere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Para la diarrea leve (hasta 3 deposiciones por día más de lo habitual), la diarrea puede ser tratado con loperamida 2 mg comprimidos - Luego tome UN comprimido después de cada evacuación, hasta un máximo de ocho comprimidos por día - Para ayudar a la diarrea: <ul style="list-style-type: none"> - Beba mucho líquido. - Coma y beba a menudo en pequeñas cantidades. - Evite calabaza, elote, naranja, papaya, ciruela, piña, mango, chayote... - Como arroz, zanahoria, papa, tortillas, atún, manzana, plátano. <p>Programe sus comidas. Siempre la ayuda de un nutriólogo/a será de utilidad.</p> <p>Pruebe con nuevos sabores o nuevas comidas.</p>

<p>Náuseas y vómitos pueden. La mayor parte de las veces es leve o moderado.</p> <p>Erupciones en la piel, o rash.</p> <p>Cansancio o fatiga crónica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es posible que le den una receta por medicamentos contra las náuseas para tomar en casa (p.e. ondansetron tabletas 8 mg cada 8 hrs). - Ingiera suficientes líquidos. - Coma y beba a menudo en pequeñas cantidades. <ul style="list-style-type: none"> - En caso de comezón leve o molestia puede usar alguna crema hidratante. - Es necesario que comente con su médico el síntoma para hacer un seguimiento y en caso necesario iniciar un tratamiento. - Por lo general no causa dolor. <p>Intente realizar ejercicios de bajo impacto. Algunas técnicas de relajación pueden ayudar (p.e. yoga)</p>
<p>La hinchazón de las manos, los pies o la parte inferior de las piernas se produce si el cuerpo retiene un exceso de líquido.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eleve los pies cuando esté sentado. - Evite la ropa ajustada.

