

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **RIBOCICLIB**

Es un medicamento, de tipo Terapia Blanco, que se usa para tratar principalmente cáncer de mama.

Eso es un comprimido que se toma por vía oral.

- Se pueden tomar análisis de sangre regularmente durante el tratamiento. La dosis y el momento de su administración del tratamiento se puede cambiar según los resultados de la prueba u otros efectos secundarios.
- Tome ribociclib por la mañana, con alimentos o con el estómago vacío.
- No mastique ni triture los comprimidos de ribociclib. Trague entero.
- Si olvida una dosis de ribociclib, omita la dosis olvidada y vuelva a su dosis habitual

Tiempos de dosificación:

- Si vomita la dosis de ribociclib, no tome una segunda dosis. Sáltese la dosis que omitió y vuelva a sus horarios de dosificación habituales.
- Otros fármacos como midazolam, rifampicina y ritonavir puede interactuar con ribociclib. Informe a su médico si está tomando estos o cualquier otro medicamento, ya que puede necesitar análisis de sangre adicionales o su dosis puede necesitar ser cambiado.
- Evite la toronja y el jugo de toronja durante la duración de su tratamiento, ya que estos pueden interactuar con ribociclib.
- El consumo de alcohol (en pequeñas cantidades) no parece afectar la seguridad
- Fertilidad:
  - Ribociclib puede dañar los espermatozoides y puede dañar al bebé si se usa durante el embarazo. Después de la última dosis.
  - Informe inmediatamente a su médico si usted o su pareja se embarazada.
  - No amamante durante el tratamiento.

- Ribociclib puede afectar la fertilidad en los hombres. Si planea tener hijos, discuta esto con su médico antes de ser tratado con ribociclib.

- Guarde las tabletas de ribociclib fuera del alcance de los niños, a temperatura ambiente, lejos de calor y luz. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
- Informe a los médicos, dentistas y otros profesionales de la salud que está recibiendo tratamiento con ribociclib antes de recibir cualquier tratamiento de ellos.

Los efectos secundarios se enumeran en la siguiente tabla en el orden en que pueden ocurrir.

EFFECTOS SECUNDARIOS	MANEJO
Las <b>náuseas y los vómitos</b> a veces pueden ocurrir.	Es posible que le den medicamentos vía oral como el Ondansetron, dexametasona, metoclopramida, entre otros, para el control de náusea en casa. Pregunte a su médico. <ul style="list-style-type: none"><li>• Beba mucho líquido.</li><li>• Coma y beba a menudo en pequeñas cantidades.</li></ul>
A veces pueden ocurrir erupciones cutáneas	Si la picazón es muy irritante informe a su médico

A veces se puede presentar **Diarrea**.

- Para la diarrea leve (hasta 3 deposiciones por día más de lo habitual), la diarrea puede ser tratado con loperamida 2 mg comprimidos

- Tome DOS tabletas a la primera señal de heces sueltas o más frecuentes de lo habitual.

- Luego tome UN comprimido después de cada evacuación, hasta un máximo de ocho comprimidos por día y continuar hasta que la diarrea se haya detenido durante 12 horas o según las indicaciones de su médico o enfermera.

- Mantenga siempre un suministro de loperamida. Usted puede comprar loperamida en cualquier farmacia sin una receta.

- Para ayudar a la diarrea:

- Beba mucho líquido.
- Coma y beba a menudo en pequeñas cantidades.
- Evite los alimentos ricos en fibra

**Deje de tomar ribociclib y consulte con su médico si tiene:**

- Cuatro deposiciones al día más de lo habitual
- Diarrea durante la noche
- Diarrea que no mejora 24 horas después de comenzar la loperamida
- Diarrea que dura más de 48 horas.

<p>A veces puede ocurrir <b>Estreñimiento</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haga ejercicio si puede, como caminatas.</li> <li>• Beba mucho líquido.</li> </ul>
<p><b>Sus glóbulos blancos pueden disminuir.</b></p> <p>Los glóbulos blancos protegen su cuerpo al combatir las bacterias (gérmenes) que causan infección. Cuando están bajos, estás en mayor riesgo de tener una infección.</p>	<p>Para ayudar a prevenir la infección:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lávese las manos con frecuencia y siempre después usando el baño.</li> <li>• Cuida tu piel y boca.</li> <li>• Evite las multitudes y las personas enfermas.</li> <li>• Tenga en cuenta los signos de infección: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiebre (más de 38°C o 100°F por un termómetro)</li> <li>- Escalofríos.</li> <li>- Tos</li> <li>- Ardor al pasar orina.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Sus plaquetas pueden disminuir durante o después de su tratamiento.</p> <p>Volverán a su normal después de su último tratamiento.</p>	<p>Para ayudar a prevenir problemas de sangrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trate de no magullarse, cortarse o quemarse.</li> <li>• Lávese la nariz soplando suavemente.</li> <li>• Evite el estreñimiento.</li> <li>• Cepílese los dientes suavemente con un suave cepillo de dientes ya que sus encías pueden sangrar más fácilmente.</li> </ul> <p>Mantener una buena higiene oral.</p>

	<p>Algunos medicamentos como la Aspirina o ibuprofeno puede aumentar su riesgo de sangrado.</p>
<p>A veces se puede causar <b>dolor en la boca</b>.</p> <p>Las llagas pueden ocurrir en la lengua, a los lados de la boca, o en la garganta.</p> <p>Las llagas o el sangrado de las encías pueden provocar una infección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepílese los dientes suavemente después de comer y a la hora de acostarse con un cepillo de dientes muy suave.</li> </ul> <p>Si sus encías sangran, use una gasa en lugar de un cepillo. Use bicarbonato de sodio en lugar de pasta de dientes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haga un enjuague bucal con 1/2 cucharadita bicarbonato de sodio o sal en 1 taza de agua tibia y enjuague varias veces al día.</li> </ul>
<p>A veces se puede presentar el <b>cansancio y la fatiga</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No conduzca un automóvil ni opere maquinaria si se siente cansado.</li> <li>• Se puede intentar entrar a un programa de actividad física cardiovascular de bajo impacto.</li> <li>• Yoga</li> <li>• Rehabilitación</li> </ul>

Ritmo cardíaco anormal raramente ocurre	<p>Minimice el riesgo de anormalidad cardíaca ritmo por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Siempre consulte con su farmacéutico y médico sobre las interacciones medicamentosas cuando comenzar un nuevo medicamento, a base de hierbas producto, o suplemento.</li><li>• Evitar la toronja y el zumo de toronja.</li></ul> <p>Informe a su médico inmediatamente o consiga Ayuda de emergencia si su corazón está latiendo irregularmente o rápido, o si se siente débil, aturdido o mareado.</p>
---	--

**DEJE DE TOMAR RIBOCICLIB Y ACUDA AL SERVICIO DE URGENCIAS SI TIENE:**

- Signos de una infección como fiebre (más de 100°F o 38°C por un termómetro oral), escalofríos temblorosos; dolor de garganta intenso, tos productiva (tos espesa o verde esputo); orina turbia o maloliente; heridas dolorosas, sensibles o hinchadas en la piel roja o Llagas.
- Signos de problemas de sangrado como heces negras y alquitranadas; sangre en la orina; Rojo puntiagudo manchas en la piel; hematomas extensos.
- Signos de problemas cardíacos o pulmonares, como latidos cardíacos rápidos o desiguales, dolor en el pecho, presión en el pecho, falta de aliento o dificultad para respirar, hinchazón de los pies o disminución piernas o desmayos.

INFORME A SU MÉDICO SOBRE LA APARICIÓN DE:

- Signos de anemia como cansancio inusual o debilidad.
- Signos de problemas hepáticos como ojos o piel amarillos, heces blancas o de color arcilla.
- Signos de problemas renales como dolor en la parte baja de la espalda o en el costado, hinchazón de los pies o en la parte inferior piernas.