

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

CARBOPLATINO + PACLITAXEL

¿Para qué sirven estos medicamentos?

Carboplatino y Paclitaxel son tratamientos de medicamentos intravenosos (IV) usados para algunos tipos de cáncer incluidos el de cuello uterino, cáncer de ovario, cáncer de cabeza y cuello, cáncer pulmonar entre otros. Pueden ser administrados además de la cirugía llevada a cabo para remover el cáncer visible. Puede recibir ya sea todo el tratamiento antes de la cirugía o puede tener la cirugía antes del tratamiento. A algunos pacientes se les recomienda no llevar a cabo cirugía. Su doctor le irá dando las recomendaciones necesarias.

¿Cómo trabajan estos medicamentos?

Carboplatino y Paclitaxel trabajan interfiriendo con el material genético de células replicantes y previniendo un incremento en el número de células cancerígenas.

Beneficios esperados

Esta terapia se está usando para limitar y/o destruir el crecimiento de células cancerígenas en el cuerpo. Puede que reduzca el riesgo del cáncer de regresar, o retrasar el tiempo hasta que el cáncer tenga un crecimiento significativo.

¿Cómo se administran estos medicamentos?

Su plan de tratamiento consiste en hasta seis "ciclos" de quimioterapia. Cada ciclo dura 3 semanas (21 días). En algunos casos puede que se decida que cada ciclo dure 4 semanas (28 días). Su doctor platicará con usted sobre esto.

Por cada ciclo, se le administrarán los dos medicamentos de manera intravenosa sólo el primer día.

- El Paclitaxel se administra primero por aproximadamente tres horas. Para ayudar a prevenir reacciones alérgicas al Paclitaxel se le administra dos medicamentos adicionales ("pre-medicamentos") antes del Paclitaxel
- El Carboplatino se administra de segundo y se aplica de manera intravenosa por media hora.

Efectos SERIOS secundarios de la quimioterapia:

Con cada tratamiento pueden surgir efectos secundarios inesperados. Estos son los síntomas que pueden presentarse una vez que se empieza el tratamiento:

EFFECTOS SECUNDARIOS SERIOS	MANEJO
Reacciones alérgicas al Paclitaxel pueden ocurrir, por lo general cuando se administra. Algunos síntomas de una reacción alérgica incluyen enrojecimiento, urticaria, irritación de la piel, sudoración, dolor en el pecho y espalda y complicaciones respiratorias. Las reacciones alérgicas al Carboplatino son menos comunes.	- La Dexametasona se usa para prevenir las reacciones alérgicas. - También se le administrarán otros medicamentos para ayudar a prevenir una reacción alérgica. El anti-histamínico puede causar cierta sensación de somnolencia y/o mareo. - Consulte con su doctor o enfermera inmediatamente si nota alguno de los síntomas listados o comienza a sentir algún tipo de malestar.

Dolor de cabeza Poco probable	-Tomar paracetamo cada 4-6 horas si se necesita, a un máximo de 4 g (4000 mg) por día. - Consular con su doctor si el dolor de cabeza persiste y si está asociado con vómitos, mareos, o cambios visuales.
Nausea y/o vómito pueden presentarse en las primeras 24 horas después de comenzar el tratamiento y pueden permanecer por varios días.	- Comer y tomar pocas cantidades. - Tomar ideas de búsquedas de internet como por ejemplo "<i>Comidas para el control de náusea</i>".
Entumecimiento o cosquilleo de los dedos de la mano o del pie. En casos raros también de la cara. Estos se disipan una vez que el tratamiento se ha concluido. Puede tomar varios meses la recuperación. Común.	- Tenga especial cuidado en el manejo de utensilios punzo-cortantes, calientes o fríos. - Informar al doctor en su próxima visita, especialmente si tiene problemas al escribir, teclear en la computadora, o recoger pequeños objetos.
Dolor muscular puede surgir unos días después del tratamiento. Muy común	Se recomienda tomar paracetamol o ibuprofeno para moderar el dolor. Informar a su doctor si el dolor interfiere con sus actividades diarias.

Dolor o sensibilidad puede surgir cuando durante la inyección. Poco común	Aplicar compresas frías por 15 a 20 minutos varias veces al día.
Estreñimiento o diarrea puede ocurrir Síntomas no tan fuertes: común Síntomas severos: raro	Para ayudar la estreñimiento: - Hacer ejercicio si se puede. - Tomar muchos líquidos (6-8 tazas al día) - Considerar laxantes durante la quimioterapia, si la estreñimiento se relaciona particularmente al tratamiento semanal. Para la diarrea: - Tomar muchos líquidos. - Comer y tomar pocas cantidades. - Evitar alimentos altos en fibra. - Informar al doctor si se presenta dolor al evacuar, sangrado, o movimientos gástricos frecuentes.

Cansancio o pérdida de energía. Común	- Tratar de mantener una rutina de ejercicio y/o salir a caminar durante el ciclo de quimioterapia. Puede hacer levantamiento de pesas ligeras para aliviar la fatiga.
Pérdida temporal de apetito es muy común con Carboplatino. Común	Usualmente el apetito volverá a la normalidad por sí solo. No necesita preocuparse si durante los primeros días no tiene apetito. Debido al cansancio, si su actividad baja, pudiese aumentar de peso.
Sudoración de las manos, pies o piernas puede presentarse si su cuerpo retiene fluidos. Poco común	Si la sudoración es un problema: - Mantener los pies elevados al descansar. - Evitar ropa apretada.
Fogajes bucales pueden surgir días después del tratamiento. Los fogajes pueden aparecer en la lengua, en los costados de la boca y en la garganta. Los fogajes y el sangrado de las encías pueden infectarse. Poco común	-Cepillarse los dientes con gentileza después de cada comida y a la hora de dormir con un cepillo de dientes suave. - Hacer buches con media cucharada de bicarbonato de sodio o sal en una taza de agua tibia y enjuagarse varias veces al día.

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

¿Qué otros medicamentos pueden hacer efecto con Carboplatino y Paclitaxel?

-Otros medicamentos como warfarina y fenitoina pueden ***hacer efecto*** con este esquema. Es necesario informar a su doctor si toman estos medicamentos ya que quizá sea necesario administrar pruebas de sangre extras o cambios en su dosificación. Consultar con su doctor antes de comenzar a tomar cualquier nuevo medicamento.

Otra información importante:

- Tomar alcohol (en pocas cantidades) no afecta la efectividad del tratamiento.
- Este tratamiento puede causar menopausia en las mujeres.
- No amamantar durante el tratamiento.
- Informar al doctor o dentista de su tratamiento con Carboplatino y Paclitaxel antes de recibir otro tipo de tratamiento.

ACUDIR A URGENCIAS INMEDIATAMENTE SI:

- Se presenta síntomas de **infección** como fiebre (arriba de 38 grados); escalofríos, tos seca, dolor al orinar.
- Presencia de **sangrado** en la materia fecal, orina o puntos rojos en toda la piel.
- Presencia de **reacciones alérgicas** poco después del tratamiento como enrojecimiento, comezón, urticaria, mareos, hinchazón de la cara o sudoración excesiva.
- Presencia de **problemas pulmonares o cardíacos** como taquicardia, dolor en el pecho, presión en el pecho, dificultad para respirar, hinchazón de los tobillos o mareos.
- Sangrado persistente, como **sangrado de la nariz** que dure más de 20 minutos.

- **Dolor abdominal** repentino o sensibilidad.
- **Dolor de cabeza** severo y persistente, con vómitos, confusión o cambios en la vista.
- **Convulsiones**
- **Nausea, vómito o diarrea incontrolable.**

Si experimenta algún síntoma o cambios en su cuerpo no descritos anteriormente pero que le preocupan, o si alguno de los síntomas es severo, acudir con su médico tratante o al servicio de urgencias.